Classe de Terminale S₂

Corrigé de l'exercice 132 page 39 (limites, fonctions)

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction f par $f(x) = \frac{x^3 - 6x^2 + 13x - 10}{x^2 - 4x + 9}$, et la fonction g par $g(x) = \frac{4x^2 - 16x - 4}{(x^2 - 4x + 9)^2}$. Le polynôme $x^2 - 4x + 9$ ne s'annule jamais, ces deux fonctions sont bien définies sur $\mathbb{R}$.

Etude de g (partie 1)

On a pour tout réel non nul x : $g(x) = \frac{x^2(4 - \frac{16}{x} - \frac{4}{x^2})}{x^4(1 - \frac{4}{x} + \frac{9}{x^2})^2} = \frac{1}{x^2} \frac{4 - \frac{16}{x} - \frac{4}{x^2}}{(1 - \frac{4}{x} + \frac{9}{x^2})^2}$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$,

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ par somme, produit et quotient. De même $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$.

Le calcul donne $g(2) = -\frac{4}{5}$. On obtient, à l'aide de l'énoncé, le tableau de variations de g :

x	$-\infty$		x_1		2		x_2		$+\infty$
$g(x)$	0	↗		↘	$-\frac{4}{5}$	↗		↘	0

D'après ce tableau, 0 et $-\frac{4}{5}$ étant strictement supérieurs à -1 , $g(x) > -1$ pour tout réel x .

Etude de f (partie 2)

Calculons pour tout réel x :

$$\begin{aligned} x - 2 + \frac{-4x + 8}{x^2 - 4x + 9} &= \frac{(x-2)(x^2 - 4x + 9) - 4x + 8}{x^2 - 4x + 9} = \frac{x^3 - 4x^2 + 9x - 2x^2 + 8x - 18 - 4x + 8}{x^2 - 4x + 9} \\ &= \frac{x^3 - 6x^2 + 13x - 10}{x^2 - 4x + 9} = f(x) \end{aligned}$$

D'après ce qui précède, on a pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 + \frac{-4(x^2 - 4x + 9) - (-4x + 8)(2x - 4)}{(x^2 - 4x + 9)^2} = 1 + \frac{-4x^2 + 16x - 36 + 8x^2 - 16x - 16x + 32}{(x^2 - 4x + 9)^2} \\ &= 1 + \frac{4x^2 - 16x - 4}{(x^2 - 4x + 9)^2} = 1 + g(x) \end{aligned}$$

Comme on a vu à la première partie que pour tout réel x , $g(x) > -1$, on a donc $f'(x) > 0$ pour tout x , et f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel non nul x , on a :

$$f(x) = \frac{x^3(1 - \frac{6}{x} + \frac{13}{x^2} - \frac{10}{x^3})}{x^2(1 - \frac{4}{x} + \frac{9}{x^2})} = x \frac{1 - \frac{6}{x} + \frac{13}{x^2} - \frac{10}{x^3}}{1 - \frac{4}{x} + \frac{9}{x^2}}. \quad \text{Comme } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{par}$$

somme, produit et quotient, et de même $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

Pour tout réel h , $f(2+h)$ et $f(2-h)$ sont définis, et :

$f(2+h) = 2+h-2 + \frac{-4(2+h)+8}{(2+h)^2-4h+9} = h + \frac{-4h}{h^2+5}$. On a donc $f(2-h) = -h + \frac{4h}{h^2+5}$, et pour tout réel h , $f(2+h) + f(2-h) = 0$. Le point $A(2; 0)$ est bien centre de symétrie de $\mathcal{C}$.

Pour tout réel non nul x , $f(x) = x-2 + \frac{-4x+8}{x^2-4x+9} = x-2 + \frac{1}{x} \frac{-4 + \frac{8}{x}}{1 - \frac{4}{x} + \frac{9}{x^2}}$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$,

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \frac{-4 + \frac{8}{x}}{1 - \frac{4}{x} + \frac{9}{x^2}} = 0$, et de même $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \frac{-4 + \frac{8}{x}}{1 - \frac{4}{x} + \frac{9}{x^2}} = 0$. On a mis $f(x)$ sous la forme

$f(x) = x-2 + h(x)$, et h tend vers 0 en $+\infty$ et $-\infty$. La droite Δ d'équation $y = x-2$ est donc asymptote à $\mathcal{C}$.

Pour étudier leurs positions relatives, on étudie le signe de h , qui est le même que celui de $-4x+8$, car le trinôme x^2-4x+9 , de discriminant négatif, est toujours positif. On en conclut que sur $]-\infty; 2]$ h est positive et $\mathcal{C}$ est au dessus de Δ , et sur $[2; +\infty[$ h est négative et $\mathcal{C}$ est en dessous de Δ .

Traçons tout ça (échelle 2 cm non respectée)